

SOC
7140


ACADÉMIE DE LA ROCHELLE.




SECTION
DES SCIENCES NATURELLES.



ANNALES.



1862-63.



N° 6.

MUS. COMP. ZOOL.
LIBRARY
APR 24 1952
HARVARD
UNIVERSITY

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOL.
CAMBRIDGE, MASS.

LA ROCHELLE,
TYPOGRAPHIE G. MARESCHAL, RUE DE L'ESCALE, 20.

1864.


FAUNE

DU DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE,

PAR ÉDOUARD BELTREMIEUX,

Membre de l'Académie de la Rochelle (Section des Sciences naturelles).



Je livre au public une œuvre imparfaite, qui aurait demandé trop de temps, pour être, sinon exempte d'erreurs, au moins aussi complète que possible. Avec le désir ardent de voir chaque département publier sa Faune et sa Flore, j'offre à notre Société des Sciences naturelles la Faune de la Charente-Inférieure, comptant sur l'indulgence que doit obtenir un travail rempli de difficultés.

Notre département, avec un climat tempéré sur les bords de l'Océan, entouré de rochers, de dunes et de marais, formé, au nord, de terrains jurassiques, au sud, de terrains crétacés, traversé par des rivières et des cours d'eau, présente une Faune des plus riches sous le rapport des animaux marins.

REPTILES. (CLASS. DE DUM.)

ORDRE DES CHÉLONIENS.

FAMILLE DES THALASSITES.

Chélonie franche, *Chelonia mydas* (Lin.) Rare, plusieurs ont été prises accidentellement dans notre rade, poussées sur nos côtes par les tempêtes. M. F.

Tortue caouanne, *Testudo caretta* (Gm.) Rare; plusieurs ont été prises sur nos côtes. M. F.

ORDRE DES SAURIENS.

FAMILLE DES LACERTIENS.

Lézard des souches, *Lacerta stirpium* (Daud.) Très-commun partout, sédentaire. M. F.

Lézard des sables, *Lacerta arenicola* (Daud.) Peu commun, sédentaire sur nos côtes sablonneuses. M. F.

Lézard vert, *Lacerta viridis* (Daud.) Assez commun partout, sédentaire. M. F.

Lézard à deux raies, *Lacerta bilineata* (Daud.) Très-commun partout, sédentaire. M. F.

Lézard des murailles, *Lacerta muralis* (Dum.) Très-commun partout, sédentaire. M. F.

FAMILLE DES SCINCOÏDIENS OU LÉPIDOSAURES.

Seps chalcide, *Seps chalcides* (Ch. B.) Très-rare.

Orvet fragile, *Anguis fragilis* (Lin.) Assez commun partout, sédentaire. M. F.

ORDRE DES OPHIDIENS.

FAMILLE DES SYNCRANTÉRIENS.

Tropidonote à collier, *Tropidonotus natrix* (Schl.)
Commun, sédentaire. M. F.

Tropidonote vipérin, *Tropidonotus viperinus*
(Schl.) Assez commun, sédentaire. M. F.

Coronelle lisse, *Coronella lævis* (*Austriacus*) (Laur.)
Peu commune, dans les lieux sablonneux, sédentaire.
M. F.

Coronelle bordelaise, *Coronella girundica* (Dum.)
Assez rare, sédentaire. M. F.

FAMILLE DES DIACRANTÉRIENS.

Zaménis vert-jaune, *Zamenis viridi-flavus* (Wagl.)
Très-commun partout, sédentaire. M. F.

Zamenis vert-jaune, var. d'Esculape *Zamenis*
viridi-flavus, var. *Æsculapii* (Sch.) Assez rare, sédentaire.
M. F.

Zamenis vert-jaune, var. Glaucoïde, *Zamenis*
viridi-flavus, var. *Glaucoïdes* (Miller.) Assez rare, séden-
taire. M. F.

FAMILLE DES VIPÉRIENS.

Pélias hérus, *Pelias berus* (Marrem.) Commun,
sédentaire. M. F.

Vipère commune, *Vipera aspis* (Marrem.) (vulgai-
rement Aspic). Assez commune, sédentaire. M. F.

ORDRE DES BATRACIENS.

FAMILLE DES RANIFORMES.

Grenouille verte, *Rana viridis* (Roesel.) Très-commune, sédentaire comme tous les batraciens. M. F.

Grenouille rousse, *Rana temporaria* (L.) Très-commune. M. F.

FAMILLE DES HYLÆFORMES.

Rainette verte, *Hyla viridis* (Laur.) Très-commune. M. F.

FAMILLE DES BUFONIFORMES.

Crapaud commun, *Bufo vulgaris* (Laur.) Très-commun. M. F.

Crapaud vert, *Bufo viridis* (Laur.) Très-commun. M. F.

Crapaud vert, var. des joncs, *Bufo calamita* (Gm.) Très-commun. M. F.

FAMILLE DES SALAMANDRIDES.

Salamandre terrestre ou tachetée, *Salamandra maculosa* (Laur.) Assez commune dans les lieux humides. M. F.

Triton crêté, *Triton cristatus* (Laur.) Assez rare, dans les fontaines. M. F.

Triton marbré, *Triton marmoratus* (Loth.) Assez commun dans les fontaines. M. F.

Triton ponctué, *Triton punctatus* (Loth.) Assez commun dans les fontaines. M. F.

Triton palmipède, *Triton palmatus* (Schl.) Assez commun dans les fontaines. M. F.

POISSONS. (CLASSIF. DE CUV.)

ORDRE DES ACANTHOPTÉRYRIENS.

FAMILLE DES PERCOÏDES.

Perche commune, *Perca fluviatilis* (L.) Commune dans les rivières. M. F.

Bars commun ou loubine, *Labrax lupus* (Cuv.) Assez commun du printemps à l'automne dans la rade de la Rochelle. M. F.

Serran commun, *Serranus cabrilla* (Val.) Rare, vient de la Méditerranée.

Grand serran, *Serranus gigas* (Cuv.)? (vulgairement Merou). Rare, vient de la Méditerranée.

Vive commune, *Trachinus draco* (Lin.) Commune en été sur les côtes de la Rochelle. M. F.

Mulle surmulet, *Mullus surmuletus* (Lin.) (vulgairement Barbarin). Assez commun en été et en automne, se tient au large. M. F.

Mulle rouget, *Mullus barbatus* (Lin.) Assez rare, paraît en été et en automne, se tient au large. M. F.

FAMILLE DES JOUES CUIRASSÉES.

Trigle rouget commun, *Trigla pini* (Bl.) Très-commun presque en toutes saisons sur nos côtes. M. F.