

LEZARD des SOUCHES ou LEZARD AGILE

Lacerta agilis Linné



Lacerta agilis, femelle.

Y. Lanceau

RÉPARTITION.

Carte n° 5

TAILLE.

18 à 22 cm dont 11 à 14 cm de queue.

COLORATION.

Variable. Il existe un dimorphisme sexuel. Le mâle a le dos gris-brun plus ou moins foncé, parfois rougeâtre. Les côtés du corps et le ventre sont verts mouchetés plus ou moins de noir. Il est parfois confondu avec le Léopard vert. La femelle a le dessus brun verdâtre ou grisâtre, les flancs ont des taches brun foncé avec ou non une tache centrale blanche. Le ventre est gris blanchâtre, cuivre ou verdâtre avec ou sans taches. Les jeunes, ressemblant aux femelles, sont gris-brun, avec des taches ocellées et le ventre vert clair. Des individus mélaniques ont été signalés.

BIOTOPE.

Lisières des bois, landes, haies, talus de voies ferrées, terrains incultes et rocailleux. Atteint 1.600 m dans le Massif Central.

COMPORTEMENT.

Moins agile que son nom le laisserait supposer. Actif le jour surtout par journée ensoleillée. Pas très farouche, il fuit cependant jusqu'à un abri qu'il a creusé ou une galerie de micro-Mammifère, lorsqu'il est dérangé.

HIVERNAGE.

Septembre - octobre à mars - avril.

NOURRITURE.

Lombrics, Crustacés, Araignées, Insectes (Mouches, Sauterelles, Chenilles).

REPRODUCTION.

Accouplement en mai. Ponte, en juin ou juillet, de 5 à 15 œufs blancs, de 12 à 14 mm de long sur 9 à 10 de large, dans le sol. Incubation 2 à 3 mois. Les jeunes, à la naissance, mesurent 4 à 5 cm. Des tentatives d'hybridation avec le Léopard vert (*Lacerta viridis*), réalisées par Rollinat (1934), n'ont jamais réussi.



Lacerta agilis, deux phases de couleur du mâle :
avec ocelles sur les flancs, Art-sur-Meurthe, G. Naulleau



sans ocelles, Kayserstuhl.

P. van den Elzen



Carte 5. *Lacerta agilis*.



Détail de la tête d'un mâle.