


Nom	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) Lézard vivipare
Données brutes (actuelles et passées)	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Vert : 2004-2013 - Orange : 1994-2003 - Rouge : < 1994</p> </div> <p>Nombre de mailles 10 km x 10 km où l'espèce est présente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basse-Normandie : 177. - Haute-Normandie : 80. <p>Nombre de mailles 10 km x 10 km où l'espèce n'a pas été observée depuis au moins 20 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basse-Normandie : 7, soit -9% de la zone d'occupation historique. - Haute-Normandie : 6, soit -46% de la zone d'occupation historique.
Données élaborées pour l'évaluation	<p>Zone d'occupation estimée et statut de rareté</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basse-Normandie : entre 1 284 et 2 832 km², commun. - Haute-Normandie : entre 564 et 1280 km², assez commun. <p>Dynamique de l'espèce</p> <ul style="list-style-type: none"> - Régression au cours du XX^e siècle : moyenne en Basse-Normandie mais très forte en Haute-Normandie (la campagne de Trun/14/61, le Perche méridional/61, la pointe de Caux/76, le plateau du Vexin/27). - Régression probablement accentuée depuis les années 1970 à cause de l'intensification des pratiques agricoles (le Bessin/14, le Pays d'Auge/14, la « plaine » d'Alençon/61, la laine de Sées/61, le Perche central/61, le Roumois/27, le Pays de Caux/76, le Petit-Caux et l'Aliermont/76). - Régression probablement toujours assez forte depuis 2004 aussi bien en Basse-Normandie qu'en Haute-Normandie où l'espèce n'a pas été revue depuis plus de 10 ans dans respectivement 33% et 44% des mailles actuelles malgré une pression de prospection sans précédents.
Autres informations	<ul style="list-style-type: none"> - Espèce euro-sibérienne. - En déclin en Bretagne (Le Garff et Paysant com. pers.), « vulnérable » dans les Pays-de-la-Loire (Marchadour 2009c), « en danger critique » dans le Centre (Dohogne 2012).
Possibilités d'immigration	<ul style="list-style-type: none"> - Présente dans les deux régions administratives normandes. - Présente dans les cinq régions limitrophes mais les populations sont assez fragmentées en Bretagne, localisées et fragmentées au nord des

	Pays-de-la-Loire (Mayenne), extrêmement rare dans le Centre, en déclin dans le sud-ouest de l'Île-de-France (Rivallin com. pers.) ainsi que dans l'ouest de la Picardie (Picardie Nature 2013). Les possibilités d'immigration semblent se réduire.
--	---

Evaluation initiale

Réduction de la taille de la population estimée entre -20% et -30% depuis 1993 dont les causes n'ont peut-être pas cessé (A2) en se basant sur l'observation directe (a), la réduction de la zone d'occupation et de la qualité de l'habitat (c).

- Basse-Normandie : Quasi menacée (NT) *pr. A2ac.*
- Haute-Normandie : Quasi menacée (NT) *pr. A2ac.*

Ajustement de la catégorie préliminaire

Aucun changement n'est apporté à la catégorie préliminaire car même si le Lézard vivipare est commun en Basse-Normandie et assez commun en Haute-Normandie, sa disparition locale est avérée dans de nombreux secteurs, y compris dans les régions limitrophes. Il ne faut donc pas s'attendre à un effet substantiel de sauvetage. En outre, les changements climatiques devraient être théoriquement défavorables à cette espèce d'affinité bioclimatique boréale.

Basse-Normandie : Quasi menacée <i>pr. A2ac</i>
--

Haute-Normandie : Quasi menacée <i>pr. A2ac</i>
--