

Ящерица, лежа на прилётной планке и греясь на солнце, спокойно поджидает возвращающихся со взятком пчел. Услышав издали характерное жужжание, она настораживается, приподнимает голову и быстрым точным движением, подпрыгивая вверх, схватывает насекомое в воздухе, часто еще до того, как оно опустится на планку. Попытки пчелы ужалить ящерицу обычно кончаются неудачей. Ящерица может проглотить подряд 3—4 пчелы; обычно же после каждой проглоченной жертвы следует более или менее длительный перерыв, во время которого она не обращает на пчел никакого внимания.

В желудках у большинства взрослых ящериц, пойманных в конце дня, находилось в среднем по 6—9 пчел; таким образом, если на каждой пасеке обитает минимум 25—30 взрослых ящериц, то можно подсчитать, что всей их популяцией ежедневно истребляется значительное количество насекомых, что, несомненно, наносит существенный вред пчеловодству.

В качестве действенной меры борьбы с ящерицами можно рекомендовать ручной отлов, проводимый на каждой пасеке 2—3 раза в месяц. При этом ящериц следует загонять под ульи, откуда их уже нетрудно выловить, приподняв ящик с одной стороны. «Прочесывая» таким образом пасеку в разных направлениях несколько раз подряд, можно надолго очистить ее территорию от ящериц.

Нужно, однако, помнить, что ящерицы истребляют большое количество насекомых—вредителей лесного и сельского хозяйства и тем приносят несомненную пользу. Поэтому ящериц, отловленных на пасеках, ни в коем случае нельзя уничтожать, а нужно выпускать на волю в отдалении от места поймки, например на полевых межах или лесных опушках.

И. С. Д а р е в с к и й

Зоологический институт Академии наук Армянской ССР

Darevsky, I.S.: Lizards are pests for beekeeping

### ЯЩЕРИЦЫ — ВРЕДИТЕЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Летом 1954 г., во время проведения полевых зоологических исследований в Закавказье, мне пришлось наблюдать, как ящерицы на горных пасеках систематически поедают довольно значительное количество пчел. Это было в июне в Ахтинском районе, Армянской ССР, на высоте около 1800 м над уровнем моря. Ежегодно, в период цветения степных трав, на целинных участках горных степей в этом районе устанавливаются многочисленные выездные пасеки, дающие богатый урожай меда. На территориях, занимаемых пасеками, обитает обычно множество ящериц *Lacerta agilis exigua* Eichw., находящих себе убежище от врагов и непогоды под ульями и греющихся в солнечную погоду на их стенках и крышах.

Исследовав содержимое желудков у нескольких особей, я обнаружил, что почти все они буквально набиты съеденными пчелами. Наблюдения над живыми ящерицами показали, что многие из них действительно регулярно питаются пчелами.