

# Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae

## 2. Nachtrag

WOLFGANG BISCHOFF

### Zusammenfassung

Vorstellung neuer Erkenntnisse über systematische Fragen innerhalb der Familie Lacertidae, die während der letzten eineinhalb Jahre publiziert wurden.

### Summary

New information concerning systematical questions within the family Lacertidae, which were published during the last one and a half years, are presented.

Seit dem Erscheinen des 1. Nachtrags zur Lacertiden-Übersicht (BISCHOFF 1993) ist wieder eine Reihe neuer Erkenntnisse über systematische Zusammenhänge innerhalb der Familie publiziert worden. Besonders hervorzuheben ist, daß die schon seit einiger Zeit bekannte lange Trennung der Eidechsen der Gattungen *Gallotia* und *Psammodromus* vom Rest der Familie (vgl. BISCHOFF 1991a, 1992b) jetzt zu systematischen Konsequenzen geführt hat. MAYER & BENYR (1994) faßten sie in der Unterfamilie Galotiinae zusammen, die sie der Unterfamilie Lacertinae gegenüberstellen, in der alle übrigen Gattungen vereinigt sind. Außerdem wurden einige neue Taxa entdeckt und beschrieben. Bei einigen anderen hat sich der taxonomische Status geändert. Mit diesem 2. Nachtrag soll die Liste aktualisiert werden.

Der Gattung *Eremias* (vgl. BISCHOFF 1991a) muß *E. lalezharica* (vgl. MORAVEC 1994) hinzugefügt werden. Einige Ergänzungen und Veränderungen sind in der Gattung *Lacerta* (vgl. BISCHOFF 1991b) vorzunehmen. Der Untergattung *Apathya* s.l. sind eine neue Unterart (*L. raddei vanensis* [vgl. EISELT et al. 1993]) und zwei Arten (*L. bendimahiensis* und *L. sapphirina* [vgl. SCHMIDTLER et al. 1994])

hinzuzufügen. Da es sich bei letzteren um parthenogenetische Arten handelt, werden sie in der nachfolgenden Liste durch "" gekennzeichnet. Innerhalb der Untergattung *Archaeolacerta* erhielt die bisher als Unterart von *L. monticola* geführte *L. bonnali* Artrang (vgl. PÉREZ-MELLADO et al. 1993). ARRIBAS (1993) unterteilte *L. bonnali* in zwei Unterarten. Neben der Nominatform beschreibt er *L. bonnali aranica* neu. ARRIBAS (1994) beschrieb schließlich auch noch *L. (Archaeolacerta) aurelioi*. Die bisher als Unterart von *L. laevis* (*Lacerta* inc.sed.) betrachtete *L. kulzeri* wurde zur Art erhoben (vgl. BISCHOFF & SCHMIDTLER 1994). In der Gattung *Podarcis* (vgl. BISCHOFF 1992a) trennte CAPULA (1994) *P. raffonei* als Art von *P. wagleriana* ab und schloß dieser *P. raffonei antoninoi* als Unterart an, die bislang ebenfalls zu *P. wagleriana* gehörte.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, daß DADD & EDWARDS (1992) mit *Acanthodactylus rotundifera* ein nomen nudum produzierten. Dieser Name gehört in die Synonymie von *Acanthodactylus erythrurus*.

***Eremias* WIEGMANN, 1834 [Wüstenrenner]**  
(*Eremias* s.str.)

*E. lalezharica* MORAVEC, 1994  
SO-Iran (Umgebung des Mt. Lalezhar).

***Lacerta* LINNAEUS, 1758 [Halsbandeidechsen]**  
(*Apathya* s.l.) [Felseidechsen]

*L. "bendimahiensis"* SCHMIDTLER, EISELT & DAREWVSKY, 1994  
O-Türkei (nordöstlich des Van-Sees).

*L. raddei vanensis* EISELT, SCHMIDTLER & DAREWSKY, 1993  
O-Türkei (östlich des Van-Sees).

*L. "sapphirina"* SCHMIDTLER, EISELT & DAREWVSKY, 1994  
O-Türkei (nördlich des Van-Sees).

(*Archaeolacerta* MERTENS, 1921) [Gebirgseidechsen]

*L. aurelioi* ARRIBAS, 1994  
Östliche Pyrenäen (Spanien, Provinz Lérida; Macizo de la Pica d'Estats).

*L. bonnali* LANTZ, 1927

*bonnali bonnali* LANTZ, 1927

Zentrale Pyrenäen (Spanien und Frankreich; außer Gebiet der nachfolgenden Unterart).

*bonnali aranica* ARRIBAS, 1993

Zentrale Pyrenäen (Spanien und Frankreich; von den Aràn-Bergen bis zum Mont Vallier-Massiv).

(*Lacerta* inc.sed.)

*L. kulzeri* MÜLLER & WETTSTEIN, 1932

Höhere Lagen des Libanon-Gebirges (vermutlich auch im Antilibanon, am Hermon-Berg und bei Petra/Jordanien [vgl. BISCHOFF & SCHMIDTLER 1994, MÜLLER & BISCHOFF 1994]).

*Podarcis* WAGLER, 1830 [Mauereidechsen]

*P. raffonei* (MERTENS, 1952)

*raffonei raffonei* (MERTENS, 1952)

Insel Strombolicchio, Liparische Inseln (nördlich Sizilien).

*raffonei antoninoi* (MERTENS, 1955)

Teile der Insel Vulcano, Liparische Inseln (nördlich Sizilien).

## Literatur

- ARRIBAS, O.J. (1993): Intraspecific variability of *Lacerta* (*Archaeolacerta*) *bonnali* LANTZ, 1927 (Squamata: Sauria: Lacertidae). — HERPETOZOA, Wien, 6(3/4): 129-140.
- (1994): Una nueva especie de Lagartija de los Pirineos Orientales: *Lacerta* (*Archaeolacerta*) *aurelioi* sp.nov. (Reptilia: Lacertidae). — Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino, 12(1): 327-351.
- BISCHOFF, W. (1991a): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 2. Die Gattungen *Eremias*, *Gallotia*, *Gastropholis*, *Heliobolus*, *Holaspis* und *Ichnotropis*. — DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 2: 14-21.
- (1991b): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 3. Die Gattung *Lacerta*. — DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 3: 5-16.
- (1992a): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 5. Die Gattung *Podarcis*. — DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 5: 6-20.
- (1992b): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 6. Die Gattungen *Poromera*, *Psammodromus*, *Pseuderemias*, *Takydromus* und *Tropidosaura*. — DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 6: 13-17.
- (1993): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 1. Nachtrag. — DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 9: 15-16.
- BISCHOFF, W. & J.F. SCHMIDTLER (1994): Ergebnisse zweier Lacertiden-Exkursionen nach Syrien. — DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 5(12): 4-22.
- CAPULA, M. (1994): Allozyme variation and differentiation in the lacertid lizard, *Podarcis wagleriana* (Reptilia: Lacertidae). — Biol. J. Linn. Soc., 52: 177-196.
- DADD, M.N. & M.A. EDWARDS (eds.) (1992): Zoological Record 1991/1992 Reptilia. — London (BIOSIS and Zool. Soc.), vol. 128, sect. 17, pp. I-XVIII + 1-261.
- EISELT, J., J.F. SCHMIDTLER & I.S. DAREVSKY (1993): Untersuchungen an Felseidechsen (*Lacerta saxicola*-Komplex) in der östlichen Türkei. 2. Eine neue Unterart der *Lacerta raddei* BOETTGER, 1892 (Squamata: Sauria: Lacertidae). — HERPETOZOA, Wien, 6(1/2): 65-70.

- MAYER, W. & G. BENYR (1994): Albumin-Evolution und Phylogenese in der Familie Lacertidae (Reptilia: Sauria). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, **96B**: 621-648.
- MORAVEC, J. (1994): A new lizard from Iran, *Eremias (Eremias) lalezharica* sp.n. (Reptilia: Lacertilia: Lacertidae). — Bonn. zool. Beitr., **45**(1): 61-66.
- MÜLLER, J. & W. BISCHOFF (1994): Bemerkungen zu den Eidechsen von Petra / Jordanien. — DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, **5**(13): 16-25.
- PÉREZ-MELLADO, V., L.J. BARBADILLO, F. BARAHONA, R.P. BROWN, C. CORTI, F. GUERRERO & B. LANZA (1993): A systematic survey of the Iberian rock lizard *Lacerta monticola* BOULENGER, 1905. — In: VALAKOS, E.D., W. BÖHME, V. PÉREZ-MELLADO & P. MARAGOU (eds.): Lacertids of the Mediterranean Region (Athens, Bonn, Alicante), pp. 85-105.
- SCHMIDTLER, J.F., J. EISELT & I.S. DAREVSKY (1994): Untersuchungen an Felseidechsen (*Lacerta-saxicola*-Gruppe) in der östlichen Türkei: 3. Zwei neue parthenogenetische Arten. — Salamandra, Bonn, **30**(1): 55-70.

Verfasser: WOLFGANG BISCHOFF, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 160, D-53113 Bonn.