

Psammodromus hispanicus FITZINGER, 1826. Lagartija cenicienta.

DESCRIPCION. Morro moderadamente largo, obtuso. Cuatro escamas supraoculares. Hay una pequeña escama adicional que separa la primera supraocular de la loreal. No hay gránulos entre las supraciliares y las supraoculares. Timpánica presente. Los tres primeros pares de submaxilares están en contacto. Escama preanal grande. Pliegue gular y collar señalados. De 32 a 42 escamas dorsales en el centro del cuerpo. De 9 a 14 poros femorales a cada lado y de 16 a 23 laminillas subdigitales (bicarinadas) bajo el cuarto dedo. Dorso de color pardo o ceniciento.




Lagartija cenicienta (*Psammotromus hispanicus*)

ciento, con dos bandas amarillas longitudinales a cada lado con manchas blancas y negras. Vientre blancuzco. El macho en celo presenta los costados verdosos y el dorso ceniciento.

LONGITUD TOTAL. Hasta 150 mm.

BIOLOGIA. Esta pequeña lagartija de los suelos arenosos vive junto a las matas y pequeños arbustos, entre los que corre con gran rapidez. A la menor señal de peligro, y para defenderse de sus enemigos, tiene la costumbre de ocultarse entre las raíces de las plantas, siendo muy difícil de capturar. Cuando no hace esto normalmente se entierra en la arena. Al parecer no tiene la costumbre de excavar galerías, como hacen otras lagartijas. La biología de la reproducción de esta especie está muy mal conocida. Las hembras ponen en mayo o junio tres o cuatro huevos que miden $9-10 \times 4-5$ mm. Al igual que las lagartijas colirrojas y colilargas, al ser capturadas emiten chillidos agudos fácilmente audibles.



DISTRIBUCION. Vive en toda la Península, exceptuando el norte de Portugal, Galicia, norte de León, Asturias, Santander. País Vasco y Pirineos.