

LACERTA LEPIDA *Lagarto ocelado*

Láms. 65, 66 y 67

Cat.: Llargandaix comú. *Vas.*: Gardatxo. *Gall.*: Lagarto arnal.

Identificación. Adultos frecuentemente hasta 20 cm de hocico a cloaca; hasta 60 cm incluyendo la cola. Ocasionalmente se citan individuos extraordinariamente grandes de hasta 80 y 90 cm de longitud total, tratándose por consiguiente de la especie mayor de Europa dentro de los lagartos. Aspecto robusto con cabeza grande y fuertes mandíbulas —especialmente los machos—. Collar formado por 9 a 13 escamas. Extremidades bien desarrolladas. Escamas del dorso redondeadas y muy pequeñas, siendo las de la cola alargadas y carenadas en el borde posterior, que es puntiagudo. Coloración general del dorso verde amarillento, a veces grisáceo o pardusco, profusamente moteado de negro formando dibujos irregulares. Costados con grandes ocelos azules (lám. 1). Esta coloración del dorso suele ser más grisácea en el sudeste de la Península. Partes inferiores blancuzcas o amarillentas. Jóvenes verdes con ocelos blancos bordeados de oscuro. En ocasiones completamente lisos. Los machos suelen tener la cabeza más grande y las mandíbulas más robustas y musculosas que las hembras, teniendo éstas los ocelos azules menos señalados y en menor número.

Especies parecidas. Los subadultos se pueden confundir con adultos de *Lacerta schreiberi* (pág. 108) y *Lacerta viridis* (pág. 112). Se diferencian de éstos por tener el cuerpo más aplanado, escamas dorsales más pequeñas y escama occipital mucho más grande. Además estas dos especies carecen por completo de ocelos azules en los costados.

Hábitat. Encontrado preferentemente en lugares secos y cálidos, en zonas de bosque abierto con matorral, olivares, taludes y bordes de carretera, pedrizas, etc. Prefiere bajas altitudes, aunque en la zona sur de la Península se puede encontrar a más de 2000 m.

Biología. Gusta de tomar el sol en algún tocón o roca cerca de su escondrijo, situado en huecos de troncos, entre piedras, en galerías excavadas por ellos mismos, o aprovechando las de roedores. A pesar de ser una especie muy terrestre trepa con facilidad por las rocas y árboles, donde puede

Lámina 66

Lacerta lepida. Lagarto ocelado. Hembra.

Lámina 67

Lacerta lepida. Lagarto ocelado. Joven.

encaramarse esporádicamente huyendo, y rara vez para alimentarse. Su alimentación, aunque básicamente insectívora, es muy variada, capturando desde coleópteros y ortópteros y todo tipo de invertebrados, hasta pequeños vertebrados (lagartos, pollos de aves, e incluso gazapos de conejo) y diversos frutos. La época de celo tiene lugar sobre abril y mayo, llegando a poner la hembra poco después de la cópula hasta 23 huevos. La incubación suele durar aproximadamente 3 meses, naciendo por tanto los pequeños lagartos hacia finales de verano.

Distribución. Prácticamente toda la Península. Falta en la zona cantábrica, País Vasco y zonas altas del Pirineo. Mapa 35.






66

67





35. *Lacerta lepida*
Lagarto ocelado
104, 65, 66 y 67