


Verzeichniss
der
Doubletten des zoologischen
Museums
der Königl. Universität zu Berlin
nebst
Beschreibung
vieler bisher unbekannter Arten

von
Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen
herausgegeben

von
Dr. *H. Lichtenstein*

erstem Director des Museums und ordentlichem Professor an der Königl. Universität.



Mit 1 terminologischen Kupfertafel.

Berlin, 1823.

In Commission bei T. Träutwein.

18. *L. Boskiana*. Daud. III. p. 188. tab. 36. fig. 2. Merr. p. 63 —
6''. — Aegypt. et Nubia

Thlr.

1

Lac. squamis carinatis, cervicis parvis, dorsi magnis subrhombicis obtusis, caudae magnis rhombicis acutis, collari subsoluto denticulato ex scutis 10, seriebus abdominalibus 10, poris femoralibus 20 — 25, in dorso lineis longitudinalibus 7, media ante furcata mox evanescente aut jam intra pedes anteriores aut intra posteriores, seriebus sex longitudinalibus punctorum alborum alternantibus cum his lineis albis, pedibus praecipue posterioribus supra irregulariter albo-maculatis, cauda corpore duplo longiore.

*Exemplaria juniora supra coeruleo-nigricantia, majora cinerascentia. Infra albida. Plerumque intra auris orificium et pedem anteriorem est utrinque linea alba, brevis, ita ut in hac parte novem existant, quot Daudin affert. Squamas valde magnas Daudin, cui erat exemplar ex insula S. Domingo, plane omisit; his praecipue, linea dorsali media furcata et scutis abdominalibus majoribus differt *L. Boskiana* a *L. veloci* Pall., quacum falso Cuvier eam conjungit, Cuv. R. An. II. p. 29.*

19. *L. grammica*. N. 10''. Aegypt., Nubia et Tataria . . . E. 1½

Lac. capite acuto, squamis dorsi parvis vix carinatis, caudae supra rhombicis carinatis, collari modo obsoleto modo conspicuo ex scutis 12, seriebus scutorum abdominalium 14 — 20, poris femoralibus 18 — 22, cauda hemiolia, in toto dorso pedum et caudae superiore facie lineolis nigris curvatis modo solutis modo in reticulum pulcherrime conjunctis.

Supra cinerascens, saepius splendore metallico; infra albida. Digi omnes squamulis acutis bifariam quasi fimbriati et in apice ante unguem falcatum squamis duabus, magnis, convexis (fere unguis laminaris formam referentibus) insignes; quae quidem digitorum structura minori modo etiam in aliis speciebus occurris. — cf. de hac specie Lichtenst. in Eversmanns Reise p. 140.

20. *L. rubropunctata*. N. 5½''. Aegypt. et Nubia . . . B. 1

Lac. capite acutiusculo, squamis dorsi parvis laevibus, squ. caudae magnis subquadratis supra carinatis, collari medio adnato in lateribus soluto, seriebus scutorum abdominalium 10, cauda

dupla corporis longitudine, capite trunco pedibus et cauda supra griseis cum maculis magnis subrotundis ferrugineo-fuscis extra ordines dispositis, infra toto corpore albido.

21. **L. guttulata.** N. 5''. Aegypt. et Nubia B. 1

Lac. capite acutiusculo, squamis dorsi minimis glabris, squa- caudae rhombicis supra carinatis, collari parvo medio adnato in lateribus soluto, seriebus scutorum abdominalium 8, cauda du- plam corporis longitudinem excedente, toto corpore supra cine- rascente confertim adsperso guttulis nigris et albis, gula ventre et caudae inferiore facie aut albidis aut notatis punctis mini- mis nigris.

-
22. **Polychrus marmoratus.** Cuv. 1½'. Am. merid. E. 1

A G A M A.

22. **A. Colotes** Daud. 1½'. Ind. or. B. 2
 24. **A. gutturosa.** Merr. 1'. Am. merid. B. 1½
 25. **A. Taraguirae.** n. Taraguirae. Marcgr.

Ag. corporis forma A. macrocephalae. Merr. (Seb. I.

93. 3.) similis; at squamis minimis, operculo incompleto denti- culato aurium aperturam partim claudente, punctis in dorso ni- gris, macula lata nigra utrinque in humero. — 8''. Brasilia E. 1½

26. **A. aculeata.** Merr. 7''. Afr. merid. 1½
 27. **A. gemmata.** Daud. 4''. ibid. 1½
 28. **A. deserti.** N. 7''. Aegyptus E. 1½

Ag. corpore flavido, capite lato squamis majoribus tecto, squa- mis dorsi majoribus et minoribus carinatis, cauda corpore pau- lo longiore.

29. **A. aralensis** N.? 8''. Lacus Aral. E. 1½

Lacerta sanguinolenta? Pall. Zoogr. III. p. 23.

Habitus antecedentis; differt: squamis omnibus aequalibus se- mirotundis carinatis in spinam acutam excurrentibus, colore sor- dide stramineo, dorso passim rubescente-maculato, cauda ni- gro-annulata. — cf. Lichtenst. I. c. p. 144.

30. **A. aurita.** Daud. *Lacerta aurita.* Pall. vid. Lichtenst. I. c. p. 142.
8''. Bucharia E. 3